

Diese Liste wurde nach besten Wissen und Sorgfalt erstellt und überprüft. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Name	Gruppe	Dosierung	Einnahme	Lagerung
Aptivus® (Tripranavir)	PI	2x tägl. 500 mg (2 Kaps.) geboostert mit 2 x tägl. 2 Kps. RTV (200 mg)	Zu den Mahlzeiten	2-8 °C , nach dem Öffnen der Packung bei 25°C 60 Tage haltbar
Atripla® (Efavirenz, EFV, Emtricitabin FTC, Tenofovir TDF)	NNRTI/ NRTI	1x tägl.	Nüchtern , vor dem Schlafengehen	Flasche dicht verschlossen ; vor Feuchtigkeit geschützt
Celsentri® (Maraviroc)	CCR5-Inhibitor	2x tägl. 150mg 2x tägl. 300mg (Standard) 2x tägl. 600mg	Nüchtern oder zu den Mahlzeiten	RT
Combivir® (AZT + 3TC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (300 mg AZT + 150 mg 3TC)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT
Crixivan® (Indinavir, IDV)	PI	2 x tägl. 2 Kps. (800 mg) geboostert mit 2 x tägl. 1 Kps. RTV (100 mg) Ungeboostert 2 Kps. (800 mg) alle 8 Std.	Nüchtern bis 1 h vor den Mahlzeiten oder mit leichter, fettfreier Mahlzeit; viel Flüssigkeit: 2-3 l / Tag	RT
Edurant (Ralpivirin, RPV)	NNRTI	1 x tägl. eine Tabl. (25 mg) mit einer Hauptmahlzeit!	Zu den Mahlzeiten	RT
Emtriva® (Emtricitabin, FTC)	NRTI	1 x tägl. 1 Kps. (200 mg)	Zu den Mahlzeiten oder Unabhängig von den Mahlzeiten	RT
Epivir® (Lamivudin, 3TC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (150mg) oder 1 x tägl. 1 Tabl. (300 mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT
Eviplera (Ralpivirin RPV, Emtricitabin FTC, Tenofovir TDF)	NNRTI / NRTI	1 x tägl. 1 Tabl.	zu einer Mahlzeit	RT
Fuzeon® (Enfuvirtid, T-20)	FI	2 x tägl. 1 ml Lsg. (= 90 mg) s. c. wenn > 42.6 kg	Spritzen an verschiedenen Stellen setzen, um Knotenbildung zu minimieren / zu verteilen	RT Zubereitete Lösung bei 2-8°C 24 Stunden haltbar
Invirase 500® (Saquinavir-mesylat, SQV-HGC)	PI	2 x tägl. 2 Kps. (1000 mg) geboostert mit 2 x tägl. 1 Kps. RTV (100 mg)	Zu den Mahlzeiten oder bis 2 h nach der Mahlzeit	RT
Intelence® Etravirin	NNRTI	2 x tägl. 2 FTA (200mg)	Nach den Mahlzeiten	RT

Isentress® (Raltegravir)	Integraseinhibitor	2 x tägl. 1 FTA (800mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT
Kaletra® (Lopinavir + Ritonavir, LPV + RTV)	PI	2 x tägl. 2 Fta (200 mg Lopinavir + 50 mg Ritonavir)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT
Kivexa® (ABC + 3TC)	NRTI	1 x tägl. 1 Tabl. (600 mg ABC + 300 mg 2TC)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT
Norvir® (Ritonavir, RTV)	PI	2x tägl. 600 mg (6 Kps.) oder in Kombinationstherapie mit anderen PI's 2x tägl. 100 - 300 mg (1-3 Kps.)	Zu den Mahlzeiten, Therapie einschleichend beginnen 1. Tag 2 x 3Kps. (300 mg) 2.-3. Tag 2 x 4 Kps. (400 mg) 4. Tag 2 x 5 Kps. (500 mg) dann 2 x 6 Kps. (600 mg)	Kps.: 2-8 °C, max. 7 Tage auch bei RT FTA: RT
Prezista® (Darunavir, DRV)	PI	2x täglich 1 Fta (600mg) geboostert mit 2x tägl. 1 Kps Norvir oder First-Line 1x täglich 2 Fta (400mg) geboostert mit 1x tägl. 1 Kps Norvir	Zu den Mahlzeiten	RT
Retrovir® (Zidovudin, AZT)	NRTH	2x tägl. 250 mg (1 Tabl.) oder 2x tägl. 300 mg (1 Tabl.)	Einnahme mit Flüssigkeit Unabhängig von den Mahlzeiten	RT
Reyataz® (Atazanavir, ATV)	PI	1x tägl. 400 mg ungeboostert (2 Tabl.a 200 mg) 1x tägl. 300mg geboostert mit 100mg Ritonavir (2 Tabl. a 150 mg) je nach Kombination ist auch Einsatz von 1x tägl.400 mg geboostert (2 Tabl. A 200mg) möglich	Zu den Mahlzeiten	RT, trocken
Sustiva® (Efaviranz, EFV)	NNRTI	1x tägl. 600 mg (3 Kps. a 200 mg) oder 1x tägl. 600 mg (1 Kps. a 600 mg)	Einnahme vor dem Schlafengehen 2 h nach dem Essen (generell 2 h Abstand zum Essen)	RT
Stribild® (Dolutegravir/Tenofovir, Emtricitabin/Cobicistat)	Integraseinhibitor/NRTI/PK-Enhancer	1 x tägl.	zu einer Mahlzeit	RT
Telzir® (Fosamprenavir)	PI	2 x tägl. 1 Tabl. (700 mg) geboostert mit 2 x tägl. 1 Kps. RTV (100 mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT

Tivicay (Dolutegravir, DTG)	INI	1 x tägl. 1 Tabl. Bei INI Resistenzen oder mit NVP,EFV, TPV/r 2x1 Tabl.	Unabhängig von den Mahlzeiten bei INI Resistenzen zu einer Mahlzeiten	RT
Triumeq (Lamivudin,3TC / Abacavir, ABC / Dolutegravir,DTG)	NRTI/INI	1 x tägl 1 Tabl.	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT
Trizivir® (AZT + 3TC + ABC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (300 mg ATZ + 150 mg 3TC + 300 mg ABC)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT
Truvada® (TDF + FTC)	NRTI	1 x tägl. 1 Tabl. (300 mg TDF + 200 mg FTC)	zu einer Mahlzeit	RT
Tybost (Cobicistat)	PK-Enhancer (Booster)	1 x tägl. (Abhängig von der Kombination)	zu einer Mahlzeit	
Videx® (Didanosin, ddl)	NRTI	1 x tägl. 1 Kps. (250 mg < 60 kg bzw. 400 mg > 60 kg)	Nüchtern 2h vorher und nachher keine Nahrungsaufnahme Einnahme mit Flüssigkeit	RT
Viracept® (Nelfinavir, NFV) Protease-Hemmer	PI	3x tägl. 750 mg (3 Tbl.) oder 2x tägl.1000-1250 mg (4-5 Tbl.)	Zu den Mahlzeiten zur Einnahme sollte immer etwas gegessen werden	RT
Viramune® (Nevirapin, NVP)	NNRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (200 mg), Alternativ 400mg Retard 1x tägl.	Einnahme mit Flüssigkeit Unabhängig von den Mahlzeiten Therapie einschleichend beginnen: 14 Tage 1 x tägl. 1 Tabl. (200mg), dann 2 x tägl. 1 Tabl. (200 mg), sonst keine Hinweise	RT
Viread® (Tenofovir, TDF)	NRTI	1 x tägl. 1 Tabl. (245 mg)	Zu den Mahlzeiten	RT
Zerit® (Stavudin, d4T)	NRTI	1 x tägl. 1 Kps. (30 mg < 60 kg bzw. 40 mg > 60 kg)	Nüchtern 1 h vor den Mahlzeiten; Falls nüchtern nicht möglich, zusammen mit kleinen, leichten Mahlzeit	RT
Ziagen® (Abacavir, ABC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (300 mg) oder 1 x tägl. 2 Tabl. (600 mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT